


May the **FORCE**

be with you...

MGA GABAY SA PAGPAPARAMI NG BIIK

BELMAN Recommends
"The Best Start For Piglets"



6TH EDITION



MGA GABAY SA PAGPAPARAMI NG BIIK

KAILAN	MGA DAPAT GAWIN	BAKIT	DAPAT GAMITIN	PARAAN NG PAGGAMIT
Linggo bago akastahan	<p>Purgahin ang inahin</p> <p>Panatilihin ang mataas na antas ng suplementong antibiotiko sa pagkain.</p>	<p>Upang maalis o maiwasan ang alinmang uri ng mga bulate na kaagaw sa mga sustanyang nakukuha sa pagkain.</p> <p>Upang puksain ang ano mang sakit na maaring makasagabal sa kalusugan ng inahin o dumalaga sa panahong pagpapalahi at masigurong maraming mabuong semilya nito.</p>	<p>PIDRO WORMKILLER</p> <p>CHLOR-SP</p>	<p>24 gramo bawat inahin na may timbang 120 K o kaya'y 0.2 gramo bawat kilong timbang.</p> <p>Lakuhan ng 1-2 kutsara (15-30) graming Chlor-SP bawat 11 kilo pakain o 1-2 bawat toneladang pagkain.</p>
2 Linggo bago akastahan	<p>Magbigay ng mahusay na antibiotiko at bitamina bago isagawa at pagkatapos ang pagbabakuna.</p> <p>Bakunahan ang inahin laban sa Hog Cholera.</p> <p>Bigyan ang inyong inahin ng higit sa pangkaraniwang dami ng pagkain. (Mga 3 ½ - 4K sa araw-araw). Bigyan sila ng mabitaminang pagkain na may mineral calcium at phosphorus.</p> <p>Turukan ng B-complex vitamins o Vitamin A D E</p>	<p>Upang maiwasan ang "Stress" at maihanda siya sa panahon ng pagbubulog.</p> <p>Upang mapangalagaan ang inahin laban sa Hog Cholera.</p> <p>Ito ay mahalaga sa pagpapataas sa bahagdan ng pangingitlog (ovulation rate).</p> <p>Upang masiguro ang pagiging malakas at masigla ng mga biik.</p>	<p>BIGG FORMULA 1 Water Soluble Granule</p> <p>HOG CHOLERA Vaccine</p> <p>MAMILI:</p> <p>1. NEW IMPROVED V-22 POWDER</p> <p>2. CECICAL</p> <p>MAMILI:</p> <p>1. VETCOMBEX Injection</p> <p>2. VITAMIN A D E</p>	<p>1 kutsara bawat 4 litrong inuming tubig. Ibigay sa loob ng 2-3 araw.</p> <p>Sundin ang isinasaad sa pakete.</p> <p>2 ½ kutsara bawat inahin araw-araw. Ihalong mabuti sa pagkain.</p> <p>1 apaw na kutsarita bawat inahin araw-araw lhalong mabuti sa pagkain.</p> <p>5 mL bawat inahin. Iturok (Intramuscular)</p> <p>5 mL bawat inahin. Iturok.</p>
pagkatapos ng pagpapakasta	<p>Bawasan ang dami ng pagkain. Bigyan lamang ng 2 ½ - 3K araw-araw. Ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga pagkaing may bitamina, mineral, calcium at phosphorus.</p>	<p>Para sa mas malusog at malakas na mga biik.</p>	<p>MAMILI:</p> <p>1. NEW IMPROVED V-22 POWDER</p> <p>2. CECICAL</p>	<p>2 ½ kutsara bawat inahin araw-araw. Ihalong mabuti sa pagkain.</p> <p>1 apaw na kutsarita araw-araw, ihalong mabuti sa pagkain.</p>
2 Linggo bago manganak	<p>Magbigay ng Electrolytes sa inuming tubig.</p> <p>Purgahin ang inahin.</p>	<p>Para maiwasan ang anumang paghihirap o stress sa buntis na inahin dulot ng pagpupurga at palakasin ang pangangatawan sa oras ng panganganak.</p> <p>Upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng bulate sa mga biik na nakukuha sa inahin habang sila ay nasa sinapupunan pa.</p>	<p>BIGG ELECTROLYTE Water Soluble Granule</p> <p>PIDRO WORMKILLER</p>	<p>1 kutsara bawat 20 litrong inuming tubig. Ibigay sa loob ng 2-3 araw.</p> <p>24 na gramo bawat inahin na may timbang 120K o kaya'y 0.2 gramo bawat kilo ng timbang. Ihalong mabuti sa pagkain o inumin.</p>
Linggo bago manganak	<p>Bigyan ang inahin ng mga berdeng pagkain gaya ng kangkong at dahon ng kamote.</p> <p>Ipagpatuloy ang pagbibigay ng bitamina at mineral.</p> <p>Isang Linggo bago manganak ay itigil muna ang pagbibigay ng calcium sa pagkain.</p> <p>Magdagdag ng antibiotiko sa pakain.</p>	<p>Upang makatulong sa pantunaw ng hayop at maiwasan ang pagtigas ng dumi at mabawasan ang pagkakaroon ng MMA Syndrome (Mastitis, Metritis Agalactiae.)</p> <p>Upang pasiglahin ang kontrol ng "Parathyroid Glands" sa paggamit ng calcium sa katawan.</p> <p>Upang mapalakas ang resistensya ng inahin sa anumang sakit at</p>	<p>KANGKONG, DAHON NG KAMOTE O DARAK</p> <p>NEW IMPROVED V-22 POWDER</p> <p>CHLOR-SP</p>	<p>2 ½ kutsara bawat inahin araw-araw. Ihalong mabuti sa pagkain.</p> <p>Lakuhan ng 1-2 kutsara (15-30 gramo) ng Chlor-SP</p>

KAILAN	MGA DAPAT GAWIN	BAKIT	DAPAT GAMITIN	PARAAN NG PAGGAMIT
3 araw bago manganak	<p>Linising mabuti at disenpektahin ang kulungang pagpapaananak.</p> <p>Linising mabuti ang inahin lalong lalo na sa may bandang mga suso.</p>	<p>Upang maiwasan ang mga mikrobyong nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga biik at inahin.</p> <p>Upang mapangalagaan ang inahin laban sa MMA Syndrome.</p>	<p>IODOSTRIKE® (ANTISEPTIC SOLUTION)</p> <p>SABON AT TUBIG</p>	<p>3 kutsara bawat 8 litrong tubig. Spray.</p> <p>Sabunin at banlawan maigi ang inahin.</p>
Pangangalaga sa bawat biik na ipinapanganak	<p>Bawat biik na inilalabas ay dapat punasan ng malinis at mamasa-masang basahan lalo na sa may ilong upang maalis ang manipis na lamad na bumabalot sa biik.</p> <p>Isunod ang pagpuputol ng pusod. Talian ng may 1 pulgada ang layo sa katawan at dampian ng antiseptiko.</p> <p>Putulin ang pangil ng biik. Kikilin ang matatalim na dulo ng pinagputulan. Iwasan magkasugat ang gilagid.</p> <p>Ilagay ang mga biik sa mainit-init at malinis na lugar hanggang matapos ang panganganak.</p>	<p>Upang mapaluwag ang paghinga ng biik.</p> <p>Upang maiwasan ang labis na pagdurugo at inpeksyon.</p> <p>Upang maiwasan ang posibleng pagkakasugat ng inahin sa pagpapasuso.</p>	<p>IODOSTRIKE® (ANTISEPTIC SOLUTION)</p>	<p>Dampian sa pamamagitan ng bulak</p>
Pagkatapos ng panganganak	<p>Linising mabuti ang inahin lalong-lalo na ang mga suso. Gumamit ng malinis at mamasa-masang basahan.</p> <p>Hugasan ang loob ng matres ng matabang na antiseptiko.</p> <p>Turukan ang inahin ng calcium.</p> <p>Turukan ang inahin ng mabisang antibiotiko.</p> <p>Turukan ang inahin ng Oxytocin.</p>	<p>Para malinis ng husto ang matres at mabawasan ang posibleng inpeksyon at MMA Syndrome.</p> <p>Upang maiwasan ang posibleng pagpapalya ng gatas o Agalactiae.</p> <p>Upang maiwasan ang MMA Syndrome at iba pang inpeksyon.</p> <p>Upang tulungang mailabas kung may naiwan pang biik sa loob ng matres. Para tulungang bumaba ang gatas at masimulan na ang pagpapasuso ng inahin.</p> <p>Upang tumulong mailabas ang inunan ng mga biik at upang tulungang linisin ang matres.</p>	<p>10% POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION</p> <p>D.C.M. o C.B.G. Injectable</p> <p>STELLITE or XZOL 24% Injectable</p> <p>ILUALCIN® Injectable</p>	<p>Gumamit ng plastik na heringilya na walang karayom, (50mL)</p> <p>Sundin ang sinasaad sa pakete</p> <p>Sundin ang sinasaad sa pakete</p> <p>Sundin ang sinasaad sa pakete</p>
1 araw pagkapanganak	<p>Bigyan ang mga biik ng mabisang gamot laban sa pagtatae.</p> <p>Maari ng pakainin ang inahin ng pagkaing nakapagpapagatas. Umpisahan ng 1k sa unang araw at dahan-dahan hanggang umabot sa 3.5 - 4k sa ika-7 araw.</p>	<p>Upang maiwasan ang pagtatae ng mga biik.</p> <p>Upang mapaganda ang daloy ng gatas ng inahin at maiwasan ang pagbaba ng timbang ng inahin.</p>	<p>ANIMYCIN Suspension</p>	<p>½ kutsarita (2.5 mL) bawat biik.</p>
3 araw pagkapanganak	<p>Turukan ang mga biik ng Iron at B-complex vitamins.</p>	<p>Ito'y laban sa anemya, pagtatae at pulmonya at silbing pampangana sa pagkain.</p>	<p>REDBIK TYLO</p> <p>VETCOMBEX Injectable</p>	<p>1 mL bawat biik, iturok sa pigi (intramuscular).</p> <p>½ mL bawat biik kasabay ng REDBIK TYLO.</p>
5 araw	<p>Ipagpatuloy muli ang pagbibigay</p>	<p>Ang mga ito ay lubhang kailangan</p>	<p>CECICAL</p>	<p>1 anaw sa kutsara hawat inahin</p>

KAILAN	MGA DAPAT GAWIN	BAKIT	DAPAT GAMITIN	PARAAN NG PAGGAMIT
5 araw pagkapanganak	<p>Dapat na nating sanayin ang ating mga alagang biik na kumain ng panimulang rasyon tulad ng piglet booster pellets. Ibigay ito sa isang malinis na sulok ng kulungan na hindi maaabot ng inahin.</p> <p>O dili kaya'y piglet booster mash at dagdagan ng tamang bitamina, mineral at protina.</p>	<p>Upang madagdagan ang sustansyang nagmula sa gatas ng inahin at mas maagang maiwalay ang mga biik dahil sa mabilis na paglaki at pagbigat ng mga ito. At tuloy maihanda ang inahin sa susunod na pagbubuntis.</p>	<p>MILKGOLD SUPER FOOD FOR SUPER PIGLET</p> <p>NEW IMPROVED V-22 POWDER</p>	<p>Sa limitadong pagkain, 2 hanggang 3 beses maghapon sa daming sapat lang makabusog sa kanila. Pama-lagiin lamang ang malinis na tubig na mainom ng mga biik. Aabot lamang halos ng isang kilo ng Milkgold ang makakain ng bawat biik - sa panahon (5-28 araw)</p> <p>(Para sa karagdagang inpormasyon, tunguhayan sa sipi ng Milkgold).</p> <p>1 apaw na kutsarita bawat kilo ng pagkain.</p>
10-14 araw pagkapanganak	<p>Turukan muli ng Iron Dextran</p>	<p>Upang makumpleto ang pangangailang Iron at tuloy lumakas ang resistensya laban sa sakit.</p>	<p>REDBIK TYLO</p>	<p>1-2 mL bawat biik. Iturok sa pigi (Intrauscular).</p>
11 araw pagkapanganak	<p>Magbigay ng mahusay na antibiotiko at bitamina bago isagawa at pagkatapos ang pagkakapon.</p> <p>Ang pagkakapon sa mga lalaking biik na hindi gagawing palahian ay maaaring isagawa. Linisin ng antiseptiko pagkatapos.</p>	<p>Upang makaiwas sa stres, sakit at komplikasyon.</p> <p>Ito'y isang paraan para mapabilis ang paglaki at pagbigat ng mga lalaking biik.</p>	<p>BIGG FORMULA 2 Water Soluble Granule</p> <p>IODOSTRIKE® (ANTISEPTIC SOLUTION)</p>	<p>1 kutsara bawat 4 litrong inuming tubig. Ibigay sa loob ng 2-3 araw.</p> <p>Gamitan ng bulak.</p>
14 araw pagkapanganak	<p>Turukan ng VITAMIN A D E ang nagsisilaking biik.</p>	<p>Para sa mas malakas na resistensya laban sa mga sakit. Mas mabilis lumaki at iwas bansot.</p>	<p>VITAMIN A D E Injection</p>	<p>0.5 mL bawat biik iturok sa pigi (Intramuscular)</p>
25-30 araw pagkapanganak	<p>Awatin na ang mga biik na may timbang na 8-10 Kgs. pataas. Sa pagwawalay ang inahin ang dapat na ilipat ng kulungan at iwanan ang mga biik sa dating kulungan.</p> <p>Maghalo ng Electrolytes sa inuming tubig bago at pagkatapos magwalay.</p> <p>Samantalang ang inahin naman ay turukan ng VITAMIN A D E bilang paghahanda sa susunod na paglalandi.</p> <p>Sa gulang ding ito maaari na nating sanayin ang ating mga biik na bigyan ng prestarter feeds hanggang sa gulang na 60 araw. Haluan ang pagkain ng mga bitaminang nakakataulong sa paglaki tulad ng bitamina, mineral, calcium, at phosphorus.</p>	<p>Sa gayong paraan mas magkakaroon ng pagkakataon makapagpahinga ang inahin at maihanda ang sarili sa susunod na paglalandi.</p> <p>Upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa panahong "Stress" o pagod.</p> <p>Upang makasigurong mabilis ang pagbabalik-landi ng inahin pagka-awat niya sa mga biik at napataas ang antas ng pagbuo ng itlog pagkatapos ng pagpapakasta.</p> <p>Para sa mabilis na paglaki at pagbigat ng inyong mga alaga.</p>	<p>BIGG ELECTROLYTES Water Soluble Granule</p> <p>VITAMIN A D E Injection</p> <p>MAMILI:</p> <p>1. HAPPY PIG</p> <p>2. CECICAL</p>	<p>1 kutsara bawat 20 litrong inuming tubig. Ibigay sa loob ng 2-3 araw.</p> <p>5 mL bawat inahin. Iturok (Intramuscular)</p> <p>1 apaw na kutsarita bawat biik araw-araw. Ihalong mabuti sa pagkain ½ kutsarita bawat biik araw-araw. Ihalong mabuti sa pagkain.</p>
7 araw pagkaawat	<p>Purgahin ang lahat ng biik.</p>	<p>Upang maalis ang lahat ng bulate sa ating mga alaga na maaring maging dahilan ng kanilang mabagal na paglaki.</p>	<p>PIDRO WORMKILLER</p>	<p>2.4 gramo bawat biik. Ihalo sa pagkain o inumin.</p>
2 Linggo pagkaawat	<p>Bakunahan ang mga biik ng panlaban sa Hog Cholera.</p> <p>Panatilihin ang antas ng suplementong antibiotiko sa pagkain.</p>	<p>Para maiwasan ang mga grabeng sakit na tulad ng Hog Cholera.</p> <p>Upang palakasin ang kanilang katawan at mapaglabanan ang epekto ng "stress" (pagod) sa mga bagong walay na biik, para maiwasan ang sakit tulad ng enteritis, pulmonya at pagkakabansot.</p>	<p>HOG CHOLERA Vaccine</p> <p>CHOR-SP</p>	<p>Sundin ang sinasaad ng pakete.</p> <p>Lakuhan ng 1-2 kutsarita (15-30 gramo) ng Chlor-SP bawat 11 kilo pagkain o 1-2 kilo bawat tonelada ng pagkain.</p>
3 Linggo	<p>Babalagaan pagpapunta sa</p>	<p>Upang tuluyang maalis ang</p>	<p>PIDRO</p>	<p>2.4 gramo bawat biik. Ihalo</p>