

# MGA GABAY SA PANGKARANIWANG SAKIT NG BABOY

SAKIT	PALATANDAAN	GAMOT	PARA MAIWASAN	PUNA
<b>A. Sakit ng inahin, dumalaga at barako</b>				
Leptospirosis (bacterial)	<p>Ang malubhang sakit ay makikita sa mga sumusunod: lagnat, pagtatae</p> <p>Ang chronic form naman ay makikita sa pamamagitan ng abortion, mahinang biik, pagkabaog, irregular na heat cycles. In boar orchitis, (pamamaga ng bayag).</p>	<p>Maraming antibiotic ang puwedeng magamit: <b>CHLOR-SP</b> Feed Premix; <b>XZOL 24%</b> Injection o dili kaya'y <b>CONCENTRIN LA</b>.</p> <p>Basahin ang literature para sa dosage at administration.</p>	<p>Pagbabakuna. Iwasan ang kontaminasyon ng ihi ng baboy. Bumili ng serologically negative ng barako. Suriin ang dugo tuwing ika-anim na buwan. Hindi dapat gamitin ang barako sa pagkasta kung ito'y may sakit na Leptospirosis para hindi maihawa ang sakit sa mga palahiing inahin.</p>	<p>Ang organismo ay nasa ihi. Maaring maihawa sa tao.</p>
Brucellosis (bacterial)	<p>Abortion, pagkabaog, hagas orchitis, namimilay (lameness), mahinang mga biik, inpeksyon.</p>	<p>Impraktikal</p>	<p>Pagbabakuna. Pagwawalay pansamantala sa mga bagong piling palahiing baboy sa lupon ng mga datihang baboy para maiwasan ang paghahawa-hawa ng sakit ng mga ito.</p> <p>Pangtaunang pagsusuri ng dugo sa mga palahiing baboy at alisin ang sinumang napatunayang may sakit.</p>	<p>Pumili ng barako sa mga walang sakit na grupo.</p>
Enzootic Pneumonia (bacterial)	<p>Pag-ubo, hirap sa paghinga, sipon</p>	<p>Gumamit ng antibiotiko tulad ng: <b>ISOLAN Injection</b> o <b>CONCENTRIN LA</b> at expectorant <b>ECOLMIN</b>.</p> <p>Sa pamamagitan ng feed. <b>CHLOR-SP</b>. Basahin ang detalye sa literature.</p>	<p>Iwasan ang masakip na kulungan ng baboy. Pamalagiing malinis at tuyo ang kulungan tuwing tag-ulan. Maglagay ng anumang tabing sa kulungan ng baboy para maiwasan ang hamog. Antibiotic supplementation ng Feed. <b>CHLOR-SP</b>.</p>	<p>Napapabilis ang pagsasalin-salin ng sakit sa lupon ng mga baboy pag ito'y hindi naagapan agad.</p>
Mastitis-Metritis-Agalactiae Complex (MMA)	<p>Naninigas, at namamagang suso. Mahinang paggagatas. Lagnat, masa-masang pwerta, na may masang na amoy. Nanghihinang inahin.</p>	<p>Bigyan ng <b>ILUALCIN</b> at <b>DCM Injection</b>. Para sa nawawalang paggagatas. isunod ang pagbibigay ng antibiotic <b>STELLITE</b> Injectable para sa inpeksyon. basahin ang detalye sa literature. Ang pagbibigay ng antibiotic ay puwedeng isabay sa <b>ILUALCIN</b> at <b>DCM</b> sa magkahiwalay na parte ng katawan. Iturok sa magkahiwalay na parte ng katawan.</p>	<p>Maghalo ng antibiotic feed supplement sa pagkain ng isang linggo bago sa inaakalang panganganak. <b>CHLOR-SP</b>. (See literature for details)</p>	<p>Wala</p>
Atrophic Rhinitis (bacterial)	<p>Paghatsing, nangingiwing nguso, pneumonia, mahinang paglaki, entritis, pagdugo ng ilong.</p>	<p>Pwedeng pagpilian: <b>ISOLAN 20%</b> <b>BELMET 25%</b> Injection <b>XZOL 24%</b> Injectable</p>	<p>Iwasan ang maalisang-sang at maduming kulungan ng baboy</p>	<p>Iba't ibang dahilan ang maaring maging sanhi ng Atrophic Rhinitis.</p>
<b>B. Sakit ng mga Biik at Bagong Walay</b>				
Piglet Scour (bacterial)	<p>Pagtatae, magaspang na balahibo. Pagpayat. Di malusog na kaanyuan.</p>	<p>Bigyan ng anti-scour antibiotic <b>ANIMYCIN SUSPENSION</b>. Para sa parenteral administration:</p> <p><b>ISOLAN 5%</b> o <b>XZOL 24%</b></p> <p>Basahin ang detalye sa literature.</p>	<p>Pamalagiing malinis at tuyo ang kulungan sa lahat ng panahon. Iwasang mabasa ang mga biik habang nililinis ang kulungan lalo na kung masama ang panahon. Iwasan na malamigan o mahamugan ang mga biik.</p>	<p>E. Coli; Salmonella Clostridium so ang dahilan.</p>
Piglet Anemia	<p>Panghihina ng katawan, magaspang na balahibo, namumutla na balat, hirap na paghinga, at mabagal na paglaki.</p>	<p>Iron Dextran Injection <b>REDBIK TYLO</b></p>	<p>Turukan ng Iron ang mga biik kapag tatlong araw na ang mga ito.</p>	<p>Wala</p>
Gastro Enteritis (bacterial)	<p>Pagsusuka, pagtatae, panghihina. Pagkawala ng ganang kumain.</p>	<p>Maghalo ng antibiotic feed supplement sa pakain:</p>	<p>Pagbibigay ng pagkain na may antibiotic <b>CHLOR-SP</b>.</p>	<p>Kapag ganito pa lang kalaki ang baboy, ito</p>

SAKIT	PALATANDAAN	GAMOT	PARA MAIWASAN	PUNA
Bacterial Pneumonia	<i>(Basahin ang mga nakasulat tungkol sa Enzootic Pneumonia)</i>			
Disease Edema	Paliko-likong paglalakad, nanginginig. Pag nakahiga ito ay may padelling movement.	Walang siguradong panglunas. Ngunit may antibiotic na nakakabawas ng inpeksyon. <b>ANIMYCIN SUSPENSION.</b>  Basahin ang literature para sa tamang dosage at administration.	Bawasan ang dami ng pakain at magdagdag ng diet fiber ng sa ganon ay maiwasan ang dagliang pagdami ng bacteria sa loob ng bituka. Pamalagiing malinis ang inuming tubig at pakain sa kulungan.  Iwasan ang biglang pag-iiba ng rasyon.	Bantayan mabuti ang sistema ng pagpapakain.

### **C. Sakit ng mga Patabaing Baboy**

Jowl Abscess	Nana	Indibidwal na pagbibigay ng lunas. Operahan ang Nana para matanggal ang pagtutubig. Lagyan ng gamot ang feed para di maulit ang pagnana: <b>CHLOR-SP.</b> O dili kaya'y turukan at gamitin ang isa sa mga ito:  <b>STELLITE</b> <b>XZOL 24% Injection</b>	Turukan ng autogenous bacterin.  Iwasan ang may naka-usling matulis na bagay sa loob ng kulungan ng baboy.	Wala
Roundworm Infection	Di bumibigat ang timbang, magaspang na balahibo, malaki ang tiyan, walang gana sa pagkain.	Bigyan ng pangpatanggal ng bulate. Sa tulong ng Piperazine <b>PIDRO WORMKILLER.</b> Basahin ang detlaye sa literature.	Sundin ang tamang programa at pamamaraan ng pagpurga sa inahin at biik.	Inspeksyon ang tae ng baboy.
Swine Dysentery	Madugo-dugong tae na may parang laway. Ang tae ay pwedeng maitim. Dahan dahang panghahawa sa ibang baboy.	Lakuhan ng antibiotiko ang pagkain. - <b>CHLOR SP.</b> o dili kaya'y turukan ng <b>ISOLAN 20%.</b> Basahin ang detalye sa literature.	Linisin mabuti ang kulungan at iwasan ang pagsisiksikan nito.	Wala
Salmonellosis	Acute enteritis, nangamamatay na baboy, panunuyo, magaspang na balahibo.  Mamasa-masang puwit na may dumi.	Maaaring pumili ng alin mang antibiotic: <b>XZOL 24% Injection</b> <b>BELMET 25% Injectable</b>	Iwasang malagyan ng dumi (tae) ang pagkain at tubig inumin ng baboy.	Maaaring mangyari ito sa lahat ng klase ng baboy.
Hog Cholera (Peste sa Baboy) viral	Walang ganang kumain, lagnat, namumula at nagmumutang mata, pagsusula, pagkamatay.  Pamumula ng walang balahibong parte ng katawan at tainga.	Hog Cholera serum at antibiotic. <b>CONCENTRIN LA</b> Para mabawasan ang inpeksyon at maiwasan ang secondary bacterial inpeksyon.	Bakunahan ang baboy laban sa sakit.	Isangguni sa BAI kung may Hog Cholera para makontrol ang sakit.
Swine Influenza viral	Hirap na paghinga, pagubo, paglabas ng uhog, lagnat, walang ganang kumainm pamamayay.	Ang antibiotic at Sulfonamides ay makakatulong sa pag-iwas ng secondary bacterial inpeksyon. Gumamit ng alinman sa sumusunod: <b>XZOL 24% Injection</b> <b>ISOLAN 20%</b>	Linisin ng mabuti ang kulungan. Kontrolin ang paglaganap ng lungworm.  Magpurga, kontra bulate.	Ang lungworm ay sanhi ng sakit na ito.
Foot and Mouth Disease (Apthous fever) FMD Viral	Lameness, sugat sa dila, nguso o bibig, sa suso at kuko ng baboy, lagnat.	Bigyan ng lunas ang sugat sa balat sa pamamagitan ng solusyon na astringent o antiseptic.  <b>IODOSTRIKE</b>	Bakunahan ang baboy laban sa sakit.	Wala

## **MAHALAGANG PAALALA:**

**PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, KUMUNSULTA SA INYONG BETERINARYO O SA MGA TAGAPAGPALAGANAP NG KAALAMAN SA**